



A KEF-13489-9/2013. számú határozat 1. számú melléklete

Engedélyokirat
biocid termék más uniós tagállamban kiadott forgalomba hozatali engedélyének
kölcsönös elismeréséhez

1. A termék neve: Black Pearl egérintő pép

2. Az engedély adatai:

Engedély száma	HU-2013-MA-14-00060-0000
OTH iktatószám	KEF-13489/2013
Engedély lejáratának időpontja	2021. június. 30.
Első engedély száma / iktatószáma / kiállítója	FR-2013-0005 / Franciaország
Termék neve az első engedélyen	Black Pearl Pasta

3. Az engedélytulajdonos adatai:

Cégnév	LODI S.A.S.
Cím	Parc d'Activités des Quatre Routes F-35390 Grand Fougeray, Franciaország
Telefon	+33 2 99 08 48 59
E-mail	regulatory@lodi.fr
Kapcsolattartó	Mme Agnès Doyen

4. A gyártó adatai:

Cégnév	Société CGB – Compagnie Générale des Biocides
Cím	Parc d'Activités des Quatre Routes F-35390 Grand Fougeray, Franciaország

5. A forgalmazó adatai:

Cégnév	Hat-Agro Higiénia Kft.
Cím	9027 Győr, Tibormajori út 1.
Telefon	06 96 525 023

6. A termék általános jellemzői:

Biocid terméktípus száma / megnevezése	14 / rágcsálóirtó szer
Felhasználási terület	házi egér (<i>Mus musculus</i>) elpusztítására
Formuláció jellege	felhasználásra kész, 5 és 10 grammos, filterpapír tasakokba kiserelt egérintő pép
Az egérintő szer keserű anyagot (Bitrex, denatónium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.	

7. A termék összetétele:

Hatóanyag	EU-szám	CAS-szám	m/m%	Gyártó
<i>alfaklóralóz</i>	240-016-7	15879-93-3	4,00	Hikal Ltd. (Maharashtra, India)
tisztasága	min. 91,0% (technikai hatóanyag)			

A termék összetétele bizalmas adat.

A teljes összetételt az Engedélyezési lap **1. számú melléklete** tartalmazza.

8. A termék osztályozása és címkézése az 1999/45/EK irányelv szerint:

Osztályozás	Nem jelölésköteles, EU-veszélyjel nem szükséges.
Kockázati mondat(ok)	–
Biztonsági mondat(ok)	S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. S49 Csak az eredeti edényzetben tárolható.

9. Forgalmazási kategória: III. forgalmazási kategóriájú irtószer**10. Egyéb felhasználási előírások:**

Felhasználói kör	foglalkozásszerű felhasználók
Felhasználás helye	zárt térben, egéirtásra

11. Csomagolás:

Felhasználói kör	Kiszereles egysége	Csomagolás formája	Forgalomba kerülő kiszereles tömege
Foglalkozásszerű	5 vagy 10 grammos, egyedi tasakok	•műanyag egéretető dobozban	5, 10 és 2x10 gramm
		•műanyag vödörben	1, 1,5, 2,5, 3 és 5 kg

12. Használati utasítás:**12.1. A műanyag egéretető dobozt tartalmazó kiszereles külső csomagolásán:**

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.
- A nyomok (fészek, lyuk, friss ürülék stb.) vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az egéretető doboz kihelyezése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
- Az egéretető dobozt illetve a pépeket tartalmazó tasakokat ne nyissuk fel!
- Az egéretető dobozt helyezzük az egerek által látogatott helyekre, feltételezett búvóhelyeik közelébe.
- Ügyeljünk arra, hogy a dobozt gyermekek és nem célszervezet állatok (egyéb vadon élő állatok, illetve házi- és haszonállatok) által hozzá nem férhető, esőtől védett helyre tegyük.

A Black Pearl egérirtó pépet tartalmazó egéretető doboz alkalmazási dózisa:

- kismértékű egérártalomnál: 5 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép);
- nagymértékű egérártalomnál: 3 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép).
- A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően – feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.
- Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük és a kiürült egéretető dobozokat cseréljük ki.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet.
- Amennyiben a dobozok érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
- Az egerek elpusztulása a fogyasztást követően 24 óra múlva várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
- Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.
- A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 7-14 nap alatt teljes rágcsálómentesség érhető el. Amennyiben az egerek aktivitása ezt követően is észlelhető, a kezelést egy eltérő (pl. véralvadásgátló) hatóanyagú rágcsálóirtó szerrel folytassuk.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

12.2. A tasakolt pépet 1–5 kg töltőtömeggel tartalmazó kiszerelés külső csomagolásán:

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.
- A nyomok (fészek, lyuk, friss ürülék stb.) vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az egéretető doboz kihelyezése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
- Az egérirtó pép kizárólag az erre a célra szolgáló – és lehetőség szerint zárható – egéretető dobozban helyezhető ki. A pépeket tartalmazó tasakokat ne nyissuk fel!
- A rágcsálóirtó szerelvényeket az egerek tapasztalt aktivitási helyeinek illetve feltételezett búvóhelyeinek közelében helyezzük el.
- Az egérirtó pépet tartalmazó tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. az etetődobozban lévő tüskék vagy drót segítségével), hogy azokat az egerek ne hurcolják el.

A Black Pearl egérirtó pép alkalmazási dózisa:

- kismértékű egérártalomnál: 5 méterenként 5-20 gramm pép;
- nagymértékű egérártalomnál: 3 méterenként 5-20 gramm pép.
- A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően – feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.
- Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük és a kiürült egéretető dobozokat cseréljük ki.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet.
- Amennyiben a dobozok érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
- Az egerek elpusztulása a fogyasztást követően 24 óra múlva várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
- Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.

- A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 7-14 nap alatt teljes rágcslómentesség érhető el. Amennyiben az egerek aktivitása ezt követően is észlelhető, a kezelést egy eltérő (pl. véralvadásgátló) hatóanyagú rágcslóirtó szerrel folytassuk.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

12.1./12.2. Minden forgalomba kerülő kiszerelésen feltüntetendő:

Rezisztenciakezelés:

- A kezelés végén az etetőállomásokat mindig gyűjtsük össze.
- A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében törekedjünk az eltérő hatásmechanizmusú vegyületet tartalmazó formulációk váltakozó alkalmazására.
- Alkalmazzunk integrált kártevőirtási rendszert, melynek a megelőzés, valamint a vegyi módszerek mellett a fizikai módszerek alkalmazása is részét képezi.
- A készítmény hatásosságát a felhasználás során figyelemmel kell követni és az esetleges hatáscsökkenés okait fel kell tárni.
- Ne alkalmazzuk a terméket olyan esetekben, ahol a hatóanyaggal szembeni rezisztencia gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll.
- Célszerű értesíteni a forgalmazót, amennyiben a termék alkalmazása nem bizonyult hatékonynak, illetve ha rezisztencia jeleit tapasztaljuk.

13. Figyelmeztetés:

Kizárólag egérintásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni.

Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a családokhoz sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.

A csalétket tilos élelmiszerral, állati takarmánnyal érintkezésbe kerülő felületeken alkalmazni! Az irtószert kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezdet kell mosni.

Beszennyezett, romlott rágcslóirtó szert ne használjon fel.

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.

A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. Ne juttassa a készítményt élővízbe.

Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

14. Elsősegélynyújtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnak.

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, illetve címkéjét.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- A lenyelt termék mennyiségétől függetlenül, ne egyen és ne igyon semmit.
- A mérgezettet stabil oldalfekvésbe kell helyezni és védeni kell a hirtelen mozdulatok vagy görcsroham esetén bekövetkező a sérülésektől.
- A mérgezett személy légzését megfigyelés alatt kell tartani.

Bőrré jutáskor:

- Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
- A bőrt bő, szappanos vízzel mossa le.
- Ne használjon oldószert, illetve higítószert.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő (lehetőség szerint langyos) vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem öblítését.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény központi idegrendszeri depresszáns, valamint görcskiváltó hatóanyagot, alfaklóralózt tartalmaz. A rágcsálóirtó szer – lenyelését követően – narkóziót, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot, nehézlégzést okozhat. A hörgőelzáródás korán bekövetkezik.

Ellenszere: Specifikus antidotum nincs, tüneti kezelés szükséges.

15. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

16. Hulladékkezelés:

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni. A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról.

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

17. Címkefelirat:

Black Pearl egérintő pép

Hatóanyaga: 4% alfaklórálóz

Gyártja: Soci t  CGB – Compagnie G n rale des Biocides, Parc d'Activit s des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray, Franciaország

Forgalmazza: Hat-Agro Higi nia Kft., 9027 Gy r, Tibormajori  t 1.

OTH enged lysz m: HU-2013-MA-14-00060-0000

valamint, az Enged lyez si lap al bbi pontjai, a csomagol s jelleg nek f ggv ny ben:

Felhasználói k�r	Csomagol�s jellege	C�mk�n felt�ntetend� pontok
Foglalkoz�sszer�	m�anyag eg�retet� dobozt is tartalmaz� kisz�r�l�sek	6., 8., 9., 10., 12.1., 13., 14., 15., 16.
	1-5 kg t�lt�t�meg� kisz�r�l�sek	6., 8., 9., 10., 12.2., 13., 14., 15., 16.

A m anyag eg retet  dobozokon felt ntetend  az al bbi sz veg:

Black Pearl eg rint  p p

Hat anyaga: 4% alfakl r l z

Gy rtja: Soci t  CGB (Franciaország)

Forgalmazza: Hat-Agro Higi nia Kft.

OTH enged lysz m: HU-2013-MA-14-00060-0000

Tov bb  az 5  s 10 grammos filterpap r tasakokon felt ntetend  az al bbi sz veg:

Black Pearl eg rint  p p

Hat anyaga: 4% alfakl r l z

18. OEK szakv lem ny sz ma: 7711/137/2013. DDO.

Budapest, 2013. okt ber 14.

